

# 令和3年度 血栓回収療法治療実績 (令和3年4月～令和4年3月)

※各医療機関が実施したすべての治療実績  
(横浜市救急隊が搬送した事案に関わらず、すべての治療実績)

## 1 報告件数


| 性別  | 人数 (割合)   |
|-----|-----------|
| 男性  | 316 (54%) |
| 女性  | 264 (46%) |
| 報告数 | 580       |

## 2 年齢分布

| 年齢    | 人数 (割合)   |
|-------|-----------|
| ～19   | 1 (0%)    |
| 20～64 | 84 (14%)  |
| 65～74 | 109 (19%) |
| 75～   | 386 (67%) |

※年齢幅は16歳～101歳、平均年齢 77歳

### 3 発症時刻から血栓回収療法 治療開始までの時間 (hr)




508名

平均時間 : 5時間13分

中央値 : 3時間11分

### 4 病院到着から血栓回収療法 治療開始までの時間 (hr)



517名

平均時間 : 1時間36分

中央値 : 1時間12分

## 穿刺3か月後mRS

|    |     |     |     | 0-2 | 3   | 4   | 5   | 6   | 合計   |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|    | 0   | 1   | 2   |     |     |     |     |     |      |
| 件数 | 65  | 66  | 67  | 198 | 63  | 113 | 94  | 69  | 537  |
| 割合 | 12% | 12% | 12% | 37% | 12% | 21% | 18% | 13% | 100% |

※mRS・・・障害の程度を表す基準のこと（下記表は日本脳卒中学会の資料を引用）

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 0 | まったく症状なし                  |
| 1 | 日常の勤めや活動は行える              |
| 2 | 身の回りのことは介助なしに行える          |
| 3 | 何らかの介助は必要とするが、歩行は介助なしに行える |
| 4 | 歩行や身体的要求には介助が必要である        |
| 5 | 寝たきり等常に介護と見守りを必要とする       |
| 6 | 死亡                        |