

医療機関ごとの実績（令和5年）

| 集計対象 (令和5年1月～令和5年12月) | 横浜市の救急隊が脳血管疾患を 活用して搬送した人数 ※1 | 通年 | | | | | 横浜市の救急隊の搬送患者のうち、 医療機関のtI P A治療実施数 | 救急隊による搬送・患者数も含めた 医療機関の全取扱件数 | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|------------|-------|-----------|--------|--------------|
| | | 救急隊の病院前評価スケールの結果を 確認した搬送患者のうち医療機関で脳血管 疾患と診断した人数 | | | | | | うち不明・その他 と診断した人数 | 脳動脈瘤クリッピング術 | うち未破裂 | 脳動脈瘤コイル塞栓術 | うち未破裂 | 開頭脳内血腫除去術 | 開頭外減圧術 | 血栓回収療法 ※2 |
| | | うちTIA・脳梗塞と 診断した人数 | うち脳出血と 診断した人数 | うちくも膜下と 診断した人数 | うち脳動脈瘤と 診断した人数 | うち脳動脈瘤クリッピング術 | | | | | | | | | |
| 1 済生会横浜市東部病院 | 382 | 138 | 96 | 33 | 2 | 7 | 11 | 14 | 4 | 47 | 36 | 52 | 34 | 23 | |
| 2 汐田総合病院 | 167 | 31 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 脳神経外科東横浜病院 | 901 | 486 | 364 | 114 | 8 | 0 | 24 | 26 | 11 | 30 | 17 | 30 | 4 | 112 | |
| 4 菊名記念病院 | 463 | 130 | 54 | 12 | 1 | 63 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | 24 | |
| 5 横浜労災病院 | 426 | 122 | 77 | 41 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 32 | 18 | 11 | 3 | 33 | |
| 6 横浜新緑総合病院 | 280 | 74 | 55 | 17 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | |
| 7 横浜新都市脳神経外科病院 | 1,069 | 374 | 227 | 108 | 12 | 27 | 39 | 23 | 18 | 167 | 107 | 21 | 16 | 136 | |
| 8 横浜総合病院 | 301 | 43 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 9 昭和大学藤が丘病院 | 324 | 59 | 50 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 49 | 36 | 15 | 4 | 17 | |
| 10 昭和大学横浜市北部病院 | 316 | 271 | 19 | 1 | 0 | 251 | 1 | 9 | 9 | 34 | 32 | 7 | 2 | 8 | |
| 11 聖隷横浜病院 | 386 | 63 | 51 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 13 | 2 | 0 | 9 | |
| 12 横浜市立市民病院 | 494 | 117 | 96 | 17 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 47 | 30 | 16 | 2 | 37 | |
| 13 イムス横浜狩場脳神経外科病院 | 631 | 237 | 184 | 46 | 4 | 3 | 19 | 4 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 12 | |
| 14 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 239 | 20 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 | 24 | 11 | 22 | 12 | 13 | 5 | 9 | |
| 15 横浜旭中央総合病院 | 874 | 329 | 166 | 53 | 2 | 108 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 29 | |
| 16 上白根病院 | 143 | 27 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 横浜鶴ヶ峰病院 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 東戸塚記念病院 | 540 | 102 | 36 | 9 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 19 国立病院機構横浜医療センター | 479 | 191 | 134 | 55 | 2 | 0 | 35 | 69 | 45 | 51 | 47 | 1 | 10 | 33 | |
| 20 西横浜国際総合病院 | 66 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 国際親善総合病院 | 343 | 60 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | |
| 22 横浜市立みなと赤十字病院 | 587 | 126 | 83 | 35 | 3 | 5 | 12 | 6 | 0 | 23 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 23 横浜中央病院 | 195 | 98 | 42 | 19 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 24 横浜国立大学附属市民総合医療センター | 144 | 35 | 24 | 7 | 1 | 3 | 6 | 20 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| 25 済生会横浜市南部病院 | 331 | 53 | 38 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 26 秋山脳神経外科病院 | 485 | 210 | 154 | 45 | 8 | 3 | 19 | 4 | 0 | 21 | 8 | 2 | 1 | 39 | |
| 27 磯子中央病院 | 95 | 27 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター | 805 | 356 | 248 | 69 | 6 | 33 | 44 | 30 | 9 | 22 | 8 | 23 | 4 | 49 | |
| 29 横浜国立大学附属病院 | 302 | 71 | 55 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 35 | 31 | 1 | 1 | 9 | |
| 30 横浜南共済病院 | 535 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 5 | 5 | 41 | 16 | 2 | 1 | 4 | |
| 31 横浜茶共済病院 | 635 | 142 | 93 | 45 | 4 | 0 | 7 | 10 | 4 | 32 | 18 | 11 | 3 | 14 | |
| 計 | 12,965 | 4,021 | 2,526 | 799 | 70 | 626 | 346 | 302 | 153 | 735 | 463 | 283 | 110 | 645 | |

◆ 令和5年時点の脳血管疾患救急医療体制に参加医療機関の実績を掲載。
◆ 搬送患者数は横浜市の救急隊が脳血管疾患を疑い搬送した件数を対象。
※1 救急隊搬送人数は消防局により集計したものであり、それ以外は医療機関が集計した数値。
※2 血栓回収用機器による治療が集計対象。

治療実績（医療機関別 t-PA 治療前 NIHSS 及び 3 か月後の mRS）

| No. | t-PA 治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3 | 3 か月後の mRS (障害の程度) ※4 |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | 18 | 5 |
| 2 | 3 | - |
| 3 | 9 | 0 |
| 4 | 20 | - |
| 5 | 17 | 5 |
| 6 | 10 | - |
| 7 | 12 | - |
| 8 | 23 | - |
| 9 | 26 | 5 |
| 10 | 5 | - |
| 11 | 7 | - |
| 12 | 15 | 0 |
| 13 | 4 | 1 |
| 14 | 6 | 4 |
| 15 | 18 | 6 |
| 16 | 5 | 3 |
| 17 | 2 | 0 |
| 18 | 5 | 5 |
| 19 | 10 | 3 |
| 20 | 5 | 0 |
| 21 | 18 | 5 |
| 22 | 2 | 1 |
| 23 | 3 | 0 |
| 24 | 7 | 2 |
| 25 | 22 | 1 |
| 26 | 4 | 1 |
| 27 | 6 | 2 |
| 28 | 12 | 4 |
| 29 | 10 | 4 |
| 30 | 2 | 0 |
| 31 | 3 | 1 |
| 32 | 5 | 0 |
| 33 | 19 | 1 |
| 34 | 3 | 1 |
| 35 | 3 | 1 |
| 36 | 10 | 3 |
| 37 | 12 | 3 |
| 38 | 21 | 3 |
| 39 | 12 | 1 |
| 40 | 9 | 0 |
| 41 | 22 | 4 |
| 42 | 19 | 5 |
| 43 | 13 | 1 |
| 44 | 20 | 4 |
| 45 | 16 | 1 |
| 46 | 22 | 1 |
| 47 | 26 | 1 |
| 48 | 10 | 3 |
| 49 | 36 | 6 |
| 50 | 20 | 4 |
| 51 | 20 | 1 |
| 52 | 23 | 6 |
| 53 | 23 | 3 |
| 54 | 20 | 3 |
| 55 | 18 | 5 |
| 56 | 16 | 2 |
| 57 | 20 | 5 |
| 58 | 13 | 1 |
| 59 | 17 | 4 |
| 60 | 16 | 5 |
| 61 | 6 | 5 |
| 62 | 6 | 0 |
| 63 | 2 | 0 |
| 64 | 6 | - |
| 65 | 7 | 2 |
| 66 | 6 | 4 |
| 67 | 6 | - |
| 68 | 2 | - |
| 69 | 24 | - |
| 70 | 4 | - |
| 71 | 20 | - |
| 72 | 12 | - |
| 73 | 9 | - |
| 74 | - | - |
| 75 | 24 | - |
| 76 | 6 | - |
| 77 | 4 | - |
| 78 | 17 | - |
| 79 | 15 | - |
| 80 | 28 | - |

| No. | t-PA 治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3 | 3 か月後の mRS (障害の程度) ※4 |
|-----|--|-----------------------------|
| 81 | 26 | - |
| 82 | 26 | - |
| 83 | 3 | - |
| 84 | 16 | - |
| 85 | 1 | - |
| 86 | 4 | - |
| 87 | 21 | - |
| 88 | 13 | - |
| 89 | 4 | - |
| 90 | 23 | - |
| 91 | 1 | - |
| 92 | 3 | - |
| 93 | 4 | - |
| 94 | 24 | - |
| 95 | 8 | - |
| 96 | 19 | - |
| 97 | 7 | - |
| 98 | 10 | - |
| 99 | 24 | - |
| 100 | 21 | - |
| 101 | 14 | - |
| 102 | 5 | - |
| 103 | 13 | - |
| 104 | 11 | - |
| 105 | 5 | - |
| 106 | 16 | 0 |
| 107 | 12 | 4 |
| 108 | 5 | 1 |
| 109 | 22 | 5 |
| 110 | 17 | 0 |
| 111 | 8 | 5 |
| 112 | 20 | 5 |
| 113 | 1 | 0 |
| 114 | 5 | 2 |
| 115 | 19 | 0 |
| 116 | 5 | 2 |
| 117 | 7 | 2 |
| 118 | 26 | 5 |
| 119 | 7 | 3 |
| 120 | 4 | 3 |
| 121 | 6 | 3 |
| 122 | 6 | 6 |
| 123 | 29 | 4 |
| 124 | 24 | 3 |
| 125 | 11 | 3 |
| 126 | 9 | 2 |
| 127 | 15 | 1 |
| 128 | 2 | 1 |
| 129 | 6 | 1 |
| 130 | 25 | 3 |
| 131 | 5 | 1 |
| 132 | 14 | 0 |
| 133 | 17 | 5 |
| 134 | 11 | 1 |
| 135 | 17 | 1 |
| 136 | 18 | 2 |
| 137 | 18 | 0 |
| 138 | 15 | 1 |
| 139 | 15 | 4 |
| 140 | 6 | 2 |
| 141 | 3 | 3 |
| 142 | 5 | 4 |
| 143 | 32 | 5 |
| 144 | 20 | 4 |
| 145 | 19 | 5 |
| 146 | 3 | 1 |
| 147 | 13 | 4 |
| 148 | 20 | 5 |
| 149 | 13 | 5 |
| 150 | 16 | 5 |
| 151 | 8 | 0 |
| 152 | 1 | 0 |
| 153 | 18 | 5 |
| 154 | 26 | 6 |
| 155 | 9 | 4 |
| 156 | 9 | 4 |
| 157 | 5 | 1 |
| 158 | 7 | 1 |
| 159 | 7 | 1 |
| 160 | 1 | 0 |
| 161 | 4 | 2 |
| 162 | 4 | 2 |

| No. | t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3 | 3か月後のmRS (障害の程度) ※4 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|
| 163 | 13 | 6 |
| 164 | 22 | 2 |
| 165 | 7 | 4 |
| 166 | 21 | 2 |
| 167 | 15 | 3 |
| 168 | 18 | - |
| 169 | 9 | - |
| 170 | 20 | 4 |
| 171 | 21 | - |
| 172 | 16 | 6 |
| 173 | 17 | - |
| 174 | 22 | 6 |
| 175 | 8 | 4 |
| 176 | 35 | 3 |
| 177 | 20 | 4 |
| 178 | 11 | 0 |
| 179 | 26 | 6 |
| 180 | 12 | - |
| 181 | 8 | 1 |
| 182 | 21 | 2 |
| 183 | - | 4 |
| 184 | 22 | 1 |
| 185 | 7 | 2 |
| 186 | 33 | 6 |
| 187 | 19 | 6 |
| 188 | 22 | 5 |
| 189 | 7 | 3 |
| 190 | 6 | 1 |
| 191 | 18 | 1 |
| 192 | 19 | 5 |
| 193 | 26 | 5 |
| 194 | 21 | 5 |
| 195 | 27 | 6 |
| 196 | 21 | 4~5 |
| 197 | 25 | 6 |
| 198 | 0 | 0 |
| 199 | 1 | 1 |
| 200 | 18 | 1 |
| 201 | 3 | 0 |
| 202 | 22 | 4 |
| 203 | 31 | 5 |
| 204 | 14 | 0 |
| 205 | 32 | 5 |
| 206 | 18 | 6 |
| 207 | 30 | 6 |
| 208 | 30 | 3 |
| 209 | 12 | 5 |
| 210 | 3 | 1 |
| 211 | 5 | 2 |
| 212 | 10 | 5 |
| 213 | 24 | 5 |
| 214 | 14 | 4 |
| 215 | 12 | 6 |
| 216 | 5 | 5 |
| 217 | 31 | 5 |
| 218 | 20 | - |
| 219 | 29 | - |
| 220 | 11 | 2 |
| 221 | 18 | 5 |
| 222 | 35 | 6 |
| 223 | 15 | 1 |
| 224 | 17 | 1 |
| 225 | 17 | 6 |
| 226 | 30 | 2 |
| 227 | 4 | 6 |
| 228 | 19 | - |
| 229 | 6 | 2 |
| 230 | 6 | 2 |
| 231 | 6 | 1 |
| 232 | 14 | 2 |
| 233 | 19 | 0 |
| 234 | 20 | 4 |
| 235 | 6 | 1 |
| 236 | - | 5 |
| 237 | 33 | 6 |
| 238 | 6 | 0 |
| 239 | 2 | 1 |
| 240 | 10 | 4 |
| 241 | 28 | 3 |
| 242 | 21 | 3 |
| 243 | 11 | 5 |
| 244 | 6 | 0 |

| No. | t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3 | 3か月後のmRS (障害の程度) ※4 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|
| 245 | 25 | 5 |
| 246 | 26 | 4 |
| 247 | 4 | 4 |
| 248 | 20 | 1 |
| 249 | 13 | 5 |
| 250 | 33 | 3 |
| 251 | 26 | 5 |
| 252 | 26 | 4 |
| 253 | 15 | 1 |
| 254 | 13 | 4 |
| 255 | 8 | 2 |
| 256 | 1 | 0 |
| 257 | 14 | 4 |
| 258 | 19 | 4 |
| 259 | 13 | 2 |
| 260 | 9 | 6 |
| 261 | 17 | 4 |
| 262 | 6 | 2 |
| 263 | 26 | 5 |
| 264 | 7 | - |
| 265 | 3 | 1 |
| 266 | 1 | 0 |
| 267 | 12 | 3 |
| 268 | 17 | 0 |
| 269 | 9 | 2 |
| 270 | 15 | - |
| 271 | 12 | 1 |
| 272 | 28 | 6 |
| 273 | 15 | 0 |
| 274 | 4 | 4 |
| 275 | 11 | 1 |
| 276 | 7 | 1 |
| 277 | 8 | 2 |
| 278 | 6 | 0 |
| 279 | 8 | 0 |
| 280 | 8 | 1 |
| 281 | 8 | 3 |
| 282 | 25 | 3 |
| 283 | 3 | 0 |
| 284 | 20 | 4 |
| 285 | 6 | 3 |
| 286 | 4 | 3 |
| 287 | 21 | 4 |
| 288 | 6 | 3 |
| 289 | 30 | 3 |
| 290 | 15 | 2 |
| 291 | 4 | 1 |
| 292 | 17 | 4 |
| 293 | 10 | 3 |
| 294 | 4 | 6 |
| 295 | 14 | 4 |
| 296 | 12 | 0 |
| 297 | 4 | 0 |
| 298 | 20 | - |
| 299 | 3 | 1 |
| 300 | 3 | 0 |
| 301 | 13 | 4 |
| 302 | 5 | 0 |
| 303 | 4 | 1 |
| 304 | 4 | 1 |

| No. | t-PA治療前の NIHSS (意識や麻痺の程度) ※3 | 3か月後のmRS (障害の程度) ※4 |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|
| 305 | 18 | 5 |
| 306 | 4 | 2 |
| 307 | 7 | 0 |
| 308 | 6 | 4 |
| 309 | 9 | 0 |
| 310 | 21 | 5 |
| 311 | 4 | 0 |
| 312 | 37 | 4 |
| 313 | 30 | 3 |
| 314 | 4 | 3 |
| 315 | 21 | 3 |
| 316 | 4 | 1 |
| 317 | 13 | 6 |
| 318 | 3 | 6 |
| 319 | 5 | 0 |
| 320 | 19 | 0 |
| 321 | 8 | 2 |
| 322 | 29 | 4 |
| 323 | 31 | 4 |
| 324 | 21 | 4 |
| 325 | 10 | 2 |
| 326 | 4 | 2 |
| 327 | 4 | 1 |
| 328 | 7 | 1 |
| 329 | 12 | 3 |
| 330 | 6 | 3 |
| 331 | 38 | 4 |
| 332 | 10 | 1 |
| 333 | 6 | 3 |
| 334 | 4 | 1 |
| 335 | 3 | 1 |
| 336 | 4 | 0 |
| 337 | 2 | 1 |
| 338 | 2 | 1 |
| 339 | 0 | 0 |
| 340 | 4 | 3 |
| 341 | 12 | 4 |
| 342 | 10 | 5 |
| 343 | 20 | 6 |
| 344 | 25 | 4 |
| 345 | 14 | 4 |
| 346 | 16 | 3 |

※3 NIHSSと呼ばれる世界共通で使われている神経症状の評価尺度の数値で、t-PA治療前に意識水準や麻痺の程度などの15の項目についてチェックをして点数化したもの。
 症状がなければ0点、一番重症度が高いものは40点となる。

※4 mRSと呼ばれる世界共通につくられている評価方法の1つで、0-1は軽症、2-3は中等症、4-5は重症、6は死亡となっている。